**DESARROLLO DE TÉCNICAS NO INVASIVAS NI DESTRUCTIVAS PARA LA
DETECCIÓN DE PLAGAS O ENFERMEDADES EN EL AGUACATE HASS A
TRAVÉS DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES TERMOGRÁFICAS**

Daniela Jiménez Vásquez
Yisela Mayorga Salazar

Proyecto de grado presentado como requisito parcial
para aspirar al título de Ingeniera Física

Directora
Mgs. Jennifer Bustamante Mejía

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ´
PROGRAMA DE INGENIERÍA FÍSICA
PEREIRA

2021

Nota de aceptación

Firma del jurado 1 - Evaluador

Firma del jurado 2 - Evaluador

Pereira, 8 de abril de 2021

La gratitud es la memoria del corazón y es por esto que hoy agradecemos a Dios y a la vida misma por permitirnos enfrentar retos que nos hacen avanzar. Agradecemos a nuestras madres, quienes siempre han sido nuestro mayor refugio e inspiración. De igual modo, agradecemos a cada docente durante el pregrado, pues forjaron en nosotras amor por nuestra carrera, por la ciencia, por el conocimiento y sin su aprendizaje no hubiese sido esto posible. Y sin duda, agradecemos a la Magister Jennifer Bustamante que depositó su confianza en nosotras y puso en nuestras manos este proyecto al cual hemos dedicado todo nuestro amor y pasión. Gracias a todos aquellos que de algún modo directo o indirecto han creído en nosotras y han aportado a que esta etapa culmine satisfactoriamente.

CONTENIDO

	pág.
1. INTRODUCCIÓN	7
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	8
1.2. JUSTIFICACIÓN	9
1.3. OBJETIVOS	10
1.3.1. Objetivo General	10
1.3.2. Objetivos Específicos	11
2. ESTADO DEL ARTE	12
3. MARCO TEÓRICO	15
3.1. Termografía infrarroja.	15
3.1.1. Termografía infrarroja activa	15
3.2. Principios físicos de la termografía.	15
3.2.1. Ondas electromagnéticas	15
3.2.2. Espectro electromagnético	16
3.2.3. Radiación de cuerpo negro	16
3.2.4. Refracción y reflexión.	17
3.2.5. Emisividad.	18

3.2.6.Difusividad.	18
3.3. Aguacate	18
3.3.1. Aguacate Hass	19
3.3.2.Plagas y enfermedades	19
4. MATERIALES Y MÉTODOS	39
4.1. Muestras	24
4.1.1. Etiquetado	24
4.2. Adquisición de imágenes	29
4.2.1. Cámara termográfica Fluke TI300	29
4.2.2. Termohigrómetro	30
4.2.3. Lámparas halógenas	30
4.2.3. Base de datos	30
4.3. Preprocesamiento y procesamiento de las imágenes	31
4.3.1. Preprocesamiento de las imágenes termográficas	31
4.3.2. Procesamiento de las imágenes termográficas	32
4.4. Clasificadores	33
4.4.1. Classification learner	33
4.4.2. Redes neuronales: Generate pattern recognition network	34
5. RESULTADOS EXPERIMENTALES	36

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 61

6.1. Conclusiones 61

6. 2 Recomendaciones 62

LISTA DE TABLAS

1. Tabla de recolección de datos
2. Convenciones para el color
3. Convenciones para las afectaciones en los frutos.
4. Valores de exactitud obtenidos en cada etapa

LISTA DE FIGURAS

1. Espectro electromagnético
2. Fenómeno de reflexión
3. Fenómeno de refracción.
4. Frutos afectados por la superficie alargada.
5. Frutos afectados por hueco superficial.
6. Frutos afectados por la plaga trips.
7. Frutos afectados por la enfermedad de la roña superficial.
8. Frutos afectados por la plaga del pasador del aguacate.
9. Multiplicación de la imagen termográfica por la máscara

10. Resultado obtenido para la red neuronal de la primera etapa.
11. Resultado obtenido para la red neuronal de la segunda etapa.
12. Resultado obtenido para la red neuronal de las etapas integradas.
13. Apariencia interfaz gráfica de usuario.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como principal objetivo desarrollar técnicas no invasivas ni destructivas para la clasificación de plagas o enfermedades en aguacate Hass a través del procesamiento de imágenes termográficas, con el fin de brindar herramientas que permitan solucionar uno de los factores principales de pérdidas económicas y retraso en el desarrollo de la agricultura colombiana, específicamente en el aguacate Hass.

Los agricultores en Colombia presentan inconvenientes a la hora de determinar la presencia de agentes patógenos en el aguacate Hass, que permitan determinar la calidad del fruto. Por lo cual, se ven forzados a desarrollar técnicas empíricas, generalmente son técnicas invasivas y poco precisas que afectan la veracidad de los resultados, además de no representar una solución para el control de calidad del producto.

Por otro lado, la importancia del cultivo de aguacate Hass en Colombia ha crecido exponencialmente, como resultado de diferentes elementos y circunstancias en el ámbito económico. Dado dicho crecimiento, se hace notable la necesidad de implementar nuevas herramientas no destructivas ni invasivas, que faciliten la identificación de plagas o enfermedades que puedan afectar a los frutos y en consecuencia, la producción y la utilidad de los mismos. Se utiliza la termografía infrarroja como la herramienta que cumple las características requeridas, y a través del procesamiento de las imágenes adquiridas, se pretende obtener una interfaz gráfica que permita al usuario hacer un control y caracterización de las plagas o enfermedades previamente etiquetadas. Es válido aclarar, que este trabajo hace parte de un macroproyecto que pretende generar un impacto a gran escala construyendo un prototipo portable que permita hacer un control completo de la calidad de los frutos.

1.1. Definición del problema

Uno de los factores principales de pérdidas económicas y retraso en el desarrollo de la agricultura colombiana, específicamente en el aguacate Hass, es la ausencia de un control de calidad que permita potencializar y tecnificar los cultivos para grandes y pequeños productores; dada esta circunstancia, se ven obligados a desarrollar técnicas empíricas que no garantizan la calidad del producto y sin un respaldo veraz que involucre la economía. El problema radica en la carencia de

técnicas no invasivas ni destructivas que permitan a los agricultores determinar la calidad del aguacate post cosecha, evidenciando múltiples pérdidas que se atribuyen a diferentes factores como plagas y enfermedades que solo se identifican por las huellas que dejan en el tronco, en las hojas o en los frutos, haciendo que muchos de estos no cumplan con los índices de calidad requeridos. De allí nace la importancia de la aplicación de nuevas herramientas no invasivas, ni destructivas, tal como la termografía infrarroja (TI), es importante hacer notar que la termografía se ha convertido en un método no invasivo de gran utilidad para la identificación, detección, aplicabilidad y rastreo de enfermedades o anomalías en diferentes frutos y plantas. Aunque el estudio de esta técnica en frutos como el aguacate no está completamente desarrollada, se encuentran elementos que permiten realizar un estudio mucho más eficaz [1]. Con el propósito de satisfacer la necesidad de los agricultores, se han desarrollado estudios con diferentes técnicas como la espectroscopia, resonancia magnética nuclear RMN, imágenes hiperespectrales, ultrasonido y rayos X. Es válido aclarar que con las técnicas anteriormente mencionadas se han obtenido resultados óptimos, aunque cada una de estas técnicas presenta alguna desventaja. Dichas desventajas están caracterizadas por el incremento de los costos computacionales en la aplicación de la técnica, la sensibilidad al ruido o a factores externos, e incluso perjuicios para la salud.

Por otro lado, se tiene que la TI es una técnica que se ha destacado con éxito en el transcurso del tiempo para el estudio de la fisiología de las plantas, la programación del riego y la previsión del rendimiento en los campos agrícolas. Esta técnica se utiliza con frecuencia para las mediciones de conducción estomatal [2,3], rastreo de enfermedades y detección de hematomas, en algunos frutos tal como las manzanas, tomates cherry y los arándanos [3,4,5]. Además, ha sido utilizada en algunos estudios para determinar el nivel de materia seca, contenido de aceite y en otros para identificar plagas, pero han sido pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas, siendo esto último un limitante significativo. Por esta razón es importante validar la termografía infrarroja como una técnica viable para la detección de plagas o enfermedades en el fruto de aguacate Hass bajo condiciones no controladas.

1.2. Justificación

El cultivo de aguacate en Colombia presenta un crecimiento exponencial en el panorama nacional. En los últimos 5 años, se estima que el consumo per cápita en Colombia aumentó cerca de 70%;

así mismo, la producción de dicho fruto alcanzó un crecimiento del 89%. Los departamentos de Tolima, Antioquia, Caldas, Santander, Bolívar, Cesar, Valle del Cauca, y Quindío, representan el 86% del total del área sembrada de aguacate en el país [6]. Los principales factores que enmarcan este crecimiento pueden considerarse a continuación: Primero, es un cultivo de sustitución de cultivos ilícitos. En segunda instancia, el consumo de aguacate ha aumentado, especialmente en los países desarrollados, por lo que los países productores tienen la oportunidad de satisfacer dicha demanda. Por último, los bajos precios del café han hecho que muchos caficultores reemplacen este por otros cultivos, de los cuales predomina el aguacate.

Por otro lado, es de notar que en los municipios del eje cafetero han empezado a reemplazar los cultivos de café por aguacate Hass, a pesar de ser reconocidos por su papel protagonista en la producción de café. Esta sustitución es una consecuencia del bajo precio que tiene el café, acompañado de un costo mayor de producción. El cultivo de aguacate Hass presenta una ventaja notable sobre el cultivo del café que radica en la mano de obra. Es decir, por cada 10 personas requeridas por un cultivo de café, solo se requieren dos para uno de aguacate [7].

Este tipo de cultivo se caracteriza por ser sumamente resistente a cambios climáticos. La gama de variedades presenta alta resistencia a las plagas. Además, dadas las propiedades de los pisos térmicos se puede cosechar aguacate durante diferentes épocas del año. A nivel mundial, se enfrenta a un panorama de crecimiento con respecto a la demanda de aguacate. México y Colombia son los únicos dos países productores que tienen aguacate durante todo el año, lo cual hace que sean más competitivos.

Las exportaciones en Colombia, presentan un alza notable como consecuencia del proceso de vía libre con Estados Unidos para este producto. En lo que corresponde a los tres primeros meses del año 2019, se habían registrado envíos de 282 toneladas a este país, y 15000 toneladas a países como Alemania, Arabia Saudita, Bélgica, Costa Rica, España, entre otros [8]. Por lo tanto, los pequeños productores requieren mejorar las condiciones de competitividad frente a los grandes exportadores. Para ello, se deben fortalecer los procesos de certificación de la calidad de sus productos, a través de la implementación de nuevas tecnologías, debido a esto se resalta la importancia del trabajo desarrollado puesto que se facilitará la identificación de plagas o enfermedades que puedan afectar a los frutos y, en consecuencia, la producción y la ganancia de

los mismos. A través de la financiación de Colciencias, se cuenta con el respaldo para dar inicio a un macro-proyecto que pretende desarrollar un equipo portable basado en termografía infrarroja que determine el nivel de materia seca, el contenido de aceite y permita la identificación de plagas o enfermedades, de forma que el agricultor pueda estar seguro de las condiciones en las que se encuentran a la hora de ofrecer sus frutos. De manera específica, el proceso investigativo radica en la identificación de plagas o enfermedades a través del procesamiento de imágenes termográficas. Teniendo en cuenta que la termografía infrarroja ha sido utilizada en algunos estudios para determinar el nivel de materia seca del aguacate Hass y en otros para identificar plagas, pero han sido pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas [9].

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar técnicas no invasivas ni destructivas para la clasificación de plagas o enfermedades en aguacate Hass a través del procesamiento de imágenes termográficas.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Construir un protocolo para la adquisición de imágenes termográficas de frutos sanos y frutos infectados.
- Implementar algoritmos para el preprocesamiento y acondicionamiento de las imágenes adquiridas con técnicas de filtrado.
- Desarrollar una metodología basada en técnicas de procesamiento de imágenes para la extracción de características por termografía infrarroja en aguacate Hass.
- Implementar técnicas de clasificación para la identificación de patrones de plagas o enfermedades en frutos afectados
- Validar si la metodología basada en termografía infrarroja es una técnica viable para la identificación de agentes patógenos en el aguacate Hass.

2. ESTADO DEL ARTE

Las enfermedades presentes en el aguacate representan una problemática profunda en cuestiones de calidad, producción y comercialización. Entre las enfermedades más comunes se conoce la enfermedad de la podredumbre de raíz de *Phytophthora* (PRR), siendo una gran amenaza en los huertos de aguacate [10]. Dicha enfermedad es un patógeno proveniente del suelo e infecta las raíces de los árboles, lo que resulta en: reducción de la recolección de agua y nutrientes, disminución del dosel y caída de las hojas [11]. Esta enfermedad también causa grandes pérdidas económicas en otros cultivos leñosos, incluidos los árboles ornamentales y frutales [12] provocando una gran pérdida de producción y la muerte de los árboles, si la enfermedad no es controlada.

En general se ha afectado la producción de aguacates en diferentes países, reduciendo los ingresos hasta un 50 % [13], debido a la presencia de la marchitez del laurel (Lw), una enfermedad vascular que impide el flujo del agua y los nutrientes en los árboles infectados causando la muerte [14], siendo Estados Unidos uno de los países afectados [15].

Se han utilizado diferentes métodos para detectar patógenos en el aguacate, como el análisis de imágenes espectrales, multiespectrales e hiperespectrales, y cada uno de ellos representa una aplicación y enfoque diferente. Entre ellos, se puede encontrar la aproximación de diferencias finitas (FDA) y la correlación bivalente (BC) para discriminar las deficiencias de marchitez del laurel Lw, hierro (Fe) y nitrógeno (N) de las plantas de aguacate sanas [14].

Con relación al impacto en los árboles infestados por Lw, se ha demostrado que el estudio de curvas de reflectancia media hiperespectral y la selección de bandas espectrales óptimas, son de gran utilidad para la identificación y estudio de los daños debido a dicha enfermedad. Además, permite realizar una discriminación de los efectos negativos en los árboles de aguacate debido a Lw, PRR, y la salinidad [13].

Para la toma de las imágenes espectrales, se utilizan elementos como lámparas portátiles halógenas usadas como fuente de luz, espectros de reflectancia y softwares aptos para el preprocesamiento de las mismas [13, 14].

Por otro lado, se hace el uso de la espectroscopía de infrarrojo visible-cercano para detectar la marchitez del laurel, comparando los patrones espectrales de hojas infectadas sintomáticas con los de hojas infectadas asintomáticas. Este método de comparación también se realiza con imágenes de fluorescencia multiespectral, con lo que es posible detectar enfermedades en sus primeras etapas [14, 16].

Es de vital importancia resaltar que el estudio y procesamiento de imágenes contribuyen de gran forma a la identificación de diferentes patologías en el aguacate. En ese sentido, la aplicabilidad de las imágenes adquiridas por métodos como la teledetección o teleobservación permite diferenciar los árboles sanos (H), los árboles infectados por PRR, además de los árboles con deficiencias de hierro (Fe) y nitrógeno (N) [17], también permite cuantificar la disminución de la cubierta vegetal asociado a la PRR en los aguacates comerciales. Las imágenes tomadas por estos métodos, permiten detectar los árboles infectados en determinada área y hacer un seguimiento de la evolución y propagación de las enfermedades [14].

Se resalta la utilidad de técnicas como la teledetección tanto como de las imágenes satelitales a la hora de detectar síntomas del ASBVd (Avocado sunblotch viroid) permitiendo diferenciar los árboles sanos de los infectados [14, 18]. Sin embargo, es necesario hacer énfasis en los sobrecostos que estas técnicas requieren.

Teniendo en cuenta el panorama desarrollado con relación al estudio de diferentes técnicas para la adquisición de imágenes, es necesario hacer notar que la termografía se ha convertido en un método no invasivo de gran utilidad para la identificación, detección, aplicabilidad y rastreo de enfermedades o anomalías en diferentes frutos y plantas.

La termografía infrarroja se ha adoptado con éxito para el estudio de la fisiología de las plantas, la programación del riego y la previsión del rendimiento en los campos agrícolas. Esta técnica se utiliza con frecuencia para las mediciones de conducción estomatal [2,3], rastreo de enfermedades

y detección de hematomas, en algunos frutos tal como las manzanas, tomates cherry y los arándanos, a causa de esto se reitera las grandes pérdidas en la industria año tras año [3,4,19]. Además, contribuye a la visualización de la formación de hielo en las hojas, tallos y frutos [20, 21,22].

Considerando lo anteriormente planteado, se han desarrollado sistemas de imágenes termográficas pulsadas para explorar su viabilidad en la detección no destructiva de moretones, así como en la clasificación de defectos en los frutos para potencializar la calidad de los mismos [19].

Uno de los frutos afectados y más vulnerables es el aguacate, ya que en los mercados los estándares de calidad son muy altos y se hace uso de conocimientos empíricos para hacer el debido tratamiento durante y después de la cosecha. Es evidente que el uso de estos métodos empíricos no garantiza un análisis certero, de allí nace la importancia de la aplicación de nuevas herramientas no destructivas tal como la termografía infrarroja. Aunque el estudio de esta técnica en frutos como el aguacate no está completamente desarrollada, se encuentran elementos que permiten realizar un estudio mucho más eficaz [1].

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Termografía infrarroja

La termografía infrarroja (TI) es la ciencia de la detección de la energía infrarroja que emite un objeto, que la convierte en temperatura aparente y muestra el resultado como una imagen infrarroja. Literalmente, termografía infrarroja significa "temperatura de la imagen" (termografía) "por debajo del color rojo" (infrarrojo) [23].

La TI es una técnica que permite medir temperaturas a distancia y sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar, mediante la captación de la intensidad de radiación infrarroja que emiten los cuerpos [24].

3.1.1 Termografía infrarroja activa

La termografía activa es un método de ensayos no destructivo (END), basado en cámaras termográficas de alta resolución, permite una rápida detección de defectos en materiales y abre nuevas posibilidades en investigación, desarrollo y control de calidad.

La termografía activa es una forma de inspeccionar un material provocando un flujo de calor con una estimulación externa. Un defecto interno puede alterar ese flujo, produciendo una distribución anómala de la temperatura [25].

3.2 Principios físicos de la termografía

3.2.1 Ondas electromagnéticas

Las ondas electromagnéticas son la combinación de ondas en campos eléctricos y magnéticos producidas por cargas en movimiento.

La creación de las ondas electromagnéticas se inicia con una partícula cargada. Esta partícula crea un campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre otras partículas. Al acelerarse la partícula, oscila en su campo eléctrico, lo que produce un campo magnético. Una vez en movimiento, los campos eléctricos y magnéticos creados por la partícula cargada se auto perpetúan, esto significa, que un campo eléctrico que oscila en función del tiempo producirá un campo magnético y viceversa [26].

Las ondas originadas por los campos eléctricos y magnéticos son de carácter transversal, encontrándose en fase, pero estando las vibraciones accionadas en planos perpendiculares entre sí. Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse. Entre ellas se encuentran las ondas de radio y las ondas infrarrojas [27].

3.2.2 Espectro electromagnético

El espectro electromagnético es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles, incluye longitudes de onda que van desde los rayos gamma de longitud de onda corta (alta frecuencia) hasta las ondas de radio de longitud de onda larga (baja frecuencia) [28].

Figura 1. Espectro electromagnético

3.2.3 Radiación de cuerpo negro

Los cuerpos negros son emisores perfectos de radiación térmica que absorbe y emite perfectamente, un cuerpo negro sirve como estándar en radiometría. Experimentalmente, el cuerpo negro es simulado más fácilmente dado que sus paredes conservan temperaturas constantes. Un objeto real tiene una radiación térmica máxima que depende de la temperatura. Esta emisión real se calcula en base a la radiación de un cuerpo negro a la misma temperatura, en otras palabras, la

emisividad de un objeto es el radio de la cantidad de radiación emitida actualmente desde la superficie de emisión por un cuerpo negro a la misma temperatura [29].

3.2.4 Refracción y reflexión

La reflexión y la refracción de las ondas son dos fenómenos que ocurren cuando una onda que se propaga en un determinado medio se encuentra con una superficie de separación con otro medio. En general, podemos decir que una parte de la onda incidente, una parte de su energía, se refleja y otra se refracta [30].

- **Reflexión**

La reflexión de una onda es el rebote que experimenta cuando llega a un obstáculo grande, como una pared. Aunque el obstáculo absorba parte de la energía recibida (incluso vibrando si entra en resonancia) se produce también reflexión en la que se transmite de vuelta parte de la energía a las partículas del medio incidente [30].

Figura 2. Fenómeno de reflexión

- **Refracción**

La refracción de una onda consiste en el cambio de dirección que experimenta cuando pasa de un medio a otro distinto. Este cambio de dirección se produce como consecuencia de la diferente velocidad de propagación que tiene la onda en ambos medios [30].

Figura 3. Fenómeno de refracción

3.2.5 Emisividad

La emisividad de un objeto es la relación entre la cantidad de radiación realmente emitida desde la superficie y la emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura. Dicha relación es simplemente un factor por el cual multiplicamos la transferencia de calor del cuerpo negro para tener en cuenta que el cuerpo negro es el caso ideal [29].

3.2.6 Difusividad

La difusividad se define como la relación entre la conductividad térmica y la capacidad de almacenamiento de energía. La difusividad térmica aparece en el análisis de conducción de calor transitorio y en la ecuación de calor, la difusividad está dada por [29]:

$$\alpha = \frac{k}{\rho c} [1]$$

Donde:

$k \rightarrow$ Constante de conductividad

$\rho \rightarrow$ Densidad

$c \rightarrow$ Calor específico

3.3 Aguacate

El aguacate es un fruto exótico carnoso que se obtiene del árbol tropical del mismo nombre. En algunas partes de América del Sur se conoce como Palta. Presenta unas dimensiones de 5-6 cm de longitud. El peso normal oscila entre 200-400 g, aunque pueden encontrarse piezas de hasta 2 kg de peso. La corteza es gruesa y dura de color verde cuyo tono depende de la variedad. La pulpa es aceitosa de color crema a verde amarillento, con un sabor similar a la nuez. Posee una única semilla redondeada de color pardo claro y 2-4 cm [30].

3.3.1 Aguacate Hass

El aguacate Hass es una de las variedades de aguacate reinas y prácticamente la más extendida en el mundo. Suele ser la que se compra en los supermercados, especialmente en el extranjero. De piel rugosa y verde oscura que se va tornando violácea casi negra según va alcanzando el estado de maduración (entre primavera y verano). La razón por la que esta variedad se ha convertido en la más consumida y cultivada es su amplio periodo de recolección, su calidad y sabor [31, 32].

Como dato importante se destaca que el cultivo de la variedad Hass corresponde al 26% del total de área sembrada con aguacate en Colombia. El 66% de la producción nacional de aguacate Hass está destinado para el mercado nacional y el 33% restante se destina para exportar [6].

3.3.2 Plagas y enfermedades

Se conoce como plaga a la irrupción súbita y multitudinaria de insectos, animales u otros organismos de una misma especie que provoca diversos tipos de perjuicios. El concepto puede entenderse de diferentes maneras. Cuando se registran a gran escala y afectan cultivos, este tipo de plagas pueden destruir cosechas enteras e impedir el normal desarrollo de la agricultura [33].

Es importante notar algunas de las plagas que afectan comúnmente los cultivos de aguacate en Colombia:

- Trips o Thysanoptera: Existen diversas especies de trips, en el cultivo de aguacate las principales especies que atacan al cultivo son *Frankliniella* y *Scirtotrips*. El principal daño lo causan en brotes vegetativos tiernos inflorescencias (pueden inhibir la fecundación) y

en frutos en sus primeras etapas (cerillo) causando daños y disminuyendo la calidad por aparición de abultamientos y deformaciones de la epidermis. Puede disminuir la calidad de la fruta hasta en un 25%. Las lesiones que causan los trips pueden ser una puerta abierta a la entrada de diversos patógenos. Muchos problemas de roña o antracnosis se pueden incrementar por una alta presencia de trips [33].

- Araña roja: Es una plaga que se encuentra en prácticamente todas las zonas productoras del aguacate, se hospeda y lo encontramos en las hojas. El daño que hace este ácaro es succionar la savia de las hojas las cuales disminuyen su actividad fotosintética y las hojas se ven físicamente de un color café – rojizo (bronceamiento) y en infestaciones graves puede ocasionar defoliación [33].
- Barrenador pequeño del hueso (*Conotrachelus perseae*): La larva de este insecto se introduce en el fruto cuando está en su primera etapa perforando la pulpa y se va alimentando de la semilla (hueso) por esta razón nos puede llegar a afectar en la producción de fruta hasta en un 80% [33].
- Escama: *Coccus viridis* (Green) (Hemiptera: Coccidae) Se alimenta de hojas, tallos y frutos. Cuando se presenta una gran cantidad de escamas, se observa fácilmente un líquido pegajoso secretado por ellas que atrae hormigas y sobre el cual crece el hongo *Capnodium* sp., causante de la fumagina (Bernal y Díaz, 2005). En altas densidades pueden causar la defoliación [33].

Por otro lado, las enfermedades en las plantas pueden definirse como un tipo de respuesta que tienen las células y los tejidos vegetales a ciertos factores ambientales, o bien a microorganismos patogénicos. Producen un determinado cambio en la función, en la forma o en la estructura de la planta. Si no se tratan a tiempo, estas enfermedades podrían derivar en la incapacidad parcial de las mismas, incluso hasta en la muerte [34].

Para que se desarrolle una enfermedad en las plantas, deben existir 3 condiciones [35]:

- Debe haber una planta huésped, es decir, la planta debe ser susceptible a la enfermedad.

- Un patógeno (virus, bacterias, hongos o parásitos) debe llegar al huésped.
- Las condiciones ambientales deben ser favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Se calcula que un 95% de estas enfermedades son causadas por hongos, aunque conviene no descuidar este 5% restante que hace referencia a infecciones bacterianas o víricas. Las enfermedades causadas por hongos suelen ser fáciles de combatir, basta con sólo usar un fungicida adecuado. Sin embargo, la cosa cambia si tenemos una infección por bacterias o por virus. En este caso no hay un producto que se considere 100% eficaz, por lo que es muy importante establecer estrategias de prevención [36].

De igual forma, es conveniente describir algunas de las enfermedades que atacan agresivamente los cultivos de aguacate en Colombia [36]:

- *Phytophthora cinnamomi*: Conocido también con el nombre de “La Tristeza del Aguacatero” o “Muerte descendente” es un hongo en la mayoría de los suelos aguacateros que provoca la pudrición de raíces. Este hongo puede causar daños en cualquier etapa del cultivo del aguacate, algunos de los síntomas del ataque por *Phytophthora cinnamomi* son la muerte y pudrición de raíces, disminución en el tamaño de las hojas, hojas cloróticas, defoliación (la mayoría de las veces empezando por la parte superior), necrosis en tejido, frutos pequeños y en el último de los casos la muerte del árbol. Los suelos con mal drenaje, con bajo contenido de materia orgánica, poco profundos y un mal manejo de los riegos en el cultivo suelen ser los más adecuados para albergar *Phytophthora* [36].
- *Antracnosis (colletotrichum gloesporoides)*: Esta enfermedad es causada por el hongo *colletotrichum gloesporoides*. Causa la pudrición de fruto a nivel de campo y en poscosecha. Ataca los brotes jóvenes, cogollos, ramas, flores y frutos. En el fruto, la infección surge en cualquier etapa de su desarrollo, provocando lesiones negras de 0,5 a 3 cm. levemente hundidas sin bordes definidos. Las manchas avanzan en diámetro, se unen

a otra y cubren gran parte del fruto. La enfermedad se ve favorecida por el ataque de otros hongos y condiciones de alta humedad [36].

- Roña (*Sphaceloma persea*): Este hongo causa daño en las hojas, tallos y frutos. El fruto puede ser atacado por la roña en cualquier etapa de su desarrollo. Cuando el ataque se presenta en las hojas, estas se tornan de color café claro con bordes acuchardados. En el fruto esta enfermedad presenta lesiones redondas o irregulares de color pardo o café claro, de apariencia corchosa y ligeramente levantadas, que al unirse una mancha con otra dan forma a una costra que no afecta la calidad de la pulpa pues el daño es solo superficial. En los frutos, las lesiones son de 1 a 2 cm de diámetro, de color negro, irregulares con bordes rojizos bien definidos y levemente deprimidos [36].
- Anillamiento del Pedúnculo: Actualmente este problema es considerado el de mayor importancia económica, por la fuerte caída de frutos con un tamaño considerable. Se presenta después del cuaje en la etapa de desarrollo del fruto, en ocasiones un árbol puede perder hasta el 90% de sus frutos [36].
- Mancha negra (*Cercospora purpura*) :Ataca las hojas y produce lesiones pequeñas de color marrón oscuro. Cuando el ataque es severo causa su caída quedando los árboles defoliados. En los frutos produce lesiones pequeñas, oscuras, de bordes irregulares y el resquebrajamiento de la corteza. Tanto las lesiones en las hojas como en el fruto facilitan la entrada para otros organismos como *Colletotrichum* [36].
- Heilipus lauri Boheman (*Coleoptera: Curculionidae*) es una especie que afecta los frutos de *Persea americana* Miller (Lauraceae) y está catalogada como plaga cuarentenaria para el mercado de Estados Unidos. En Colombia se ha detectado en varios departamentos, no obstante, su manejo se dificulta debido a la escasa información sobre su biología y hábitos [37].

4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Muestras

En el proceso de adquisición de imágenes, se utilizó una muestra de 120 aguacates que fueron adquiridos de un centro de acopio (CA) ubicado en el corregimiento de la Florida, Risaralda; todos los frutos presentaban diferentes anomalías. Las muestras se encontraban en los cuatro estados de madurez: verdes, pintones, maduros y en descomposición. No se logró tener información precisa y tecnificada sobre las irregularidades presentadas en los frutos, ya que en el 2020 por pandemia de coronavirus no fue posible realizar la visita al centro de acopio, puesto que no aceptan personal externo al CA. Es importante aclarar que las muestras hacen parte del grupo de frutos de descarte del CA, los cuales corresponden a los frutos que presentan anomalías visibles y no cumplen los estándares de calidad.

4.1.1 Etiquetado

Dado que no se contó con apoyo técnico para el reconocimiento de las afectaciones y el etiquetado de las muestras, fue necesario realizar diversas consultas y el análisis pertinente de las diferentes plagas y enfermedades más comunes en el aguacate. Con lo anterior se logró asociar cada fruto con cinco principales plagas vistas en diferentes manuales [33]. Después de adquirir las muestras, se realizó el respectivo etiquetado, con el fin de determinar el estado cualitativo de los frutos. La codificación se realizó con el consecutivo **AHA** (Aguacate Hass Acopio). Con el fin de obtener más información acerca de los frutos, se llenó la tabla 1 con la información de las características de las muestras, en la tabla 2 se expone las convenciones usadas para el color de los aguacates, este se realizó subjetivamente, y en la tabla 3 se encuentran las convenciones usadas para determinar la afectación de cada fruto.

	Código	Color	Daño mecánico		Afectación
			Si	No	
1	AHA1				
2	AHA2				
3	AHA3				
4	AHA4				
5	AHA5				
6	AHA6				
7	AHA7				
8	AHA8				
9	AHA9				

Tabla 1. Tabla de recolección de datos

Color	
Verde	A
Verde negruzco	B
Morado negruzco	C
Marrón	D
Negro	E

Tabla 2. Convenciones para el color

Plaga	Nombre
1	SUPERFICIAL ALARGADA
2	HUECO SUPERFICIAL
3	THRIPS
4	ROÑA
5	PASADOR

Tabla 3. Convenciones para las afectaciones en los frutos

Las cinco plagas o enfermedades que fueron observadas durante el proceso de etiquetado para la clasificación fueron:

- Superficial alargada: Es una afectación en la superficie del fruto de color pardo, esta tiene forma alargada, pronunciada y suele expandirse por gran parte del fruto lo que hace que sea muy notable, se estima que es una enfermedad que es causada por un hongo, aunque no se conoce técnicamente a qué tipo de hongo se le atribuye.

Figura 4. Frutos afectados por la superficie alargada.

- Hueco superficial: Se destaca una afectación en la superficie del fruto en la cual se observa un agujero, este no es fácil de identificar, pero representa de algún agente patógeno.

Figura 5. Fruto afectado por hueco superficial

- Trips: Se evidencia una serie de huellas de color negro o marrón oscuro que se asocian a la presencia de insectos conocidos como trips, esta plaga es bastante común y es la puerta abierta a una serie de enfermedades un poco más agresivas.

Figura 6. Fruto afectado por la plaga trips.

- Roña: Es una enfermedad causada por un hongo que ataca las hojas, tallos y frutos. Las lesiones que presenta en el fruto se caracterizan por ser redondas o irregulares, de color pardo o marrón claro, el daño es solo superficial.

Figura 7 . Fruto afectado por enfermedad de la roña.

- Pasador: Se evidencia una perforación profunda en el fruto como consecuencia de la presencia en estado larval del insecto conocido como pasador del aguacate (*stenoma catenifer*).

Figura 8. Fruto afectado por la plaga del pasador del aguacate.

4.2 Adquisición de imágenes

En la etapa de adquisición de las imágenes intervinieron diferentes elementos, cabe resaltar los más importantes: la cámara termográfica, el termohigrómetro y las lámparas halógenas que cumple la función de fuente de calentamiento.

4.2.1 Cámara termográfica Fluke Ti300

La cámara termográfica Fluke Ti300 es una cámara portátil, de fácil uso que captura imágenes en el infrarrojo, lo que la hace apta para numerosas aplicaciones. Estas aplicaciones incluyen reparación de equipos, mantenimiento preventivo y predictivo, diagnóstico de edificios e investigación y desarrollo.

La cámara cuenta con dos grandes características: La primera característica es la obtención de imágenes, en la cual se logra un enfoque consistente con precisión milimétrica y con una definición de 5 megapíxeles, también tiene la capacidad de mostrar imágenes completas de 640x480 píxeles, las imágenes se pueden guardar en una tarjeta de memoria extraíble que se pueden transferir a través de una memoria a un computador. Se puede hacer captura de imágenes en intervalos de tiempo de mínimo 3 segundos de manera automática, disminuyendo así el error humano por

disparo de la cámara; la segunda característica está respaldada por su facilidad de portabilidad, la cámara puede ser llevada al campo de estudio sin ningún inconveniente, entre otras cosas por su tamaño y batería recargable, inteligente y extraíble. Por otro lado, la cámara cuenta con pantalla táctil LED de cinco segmentos para mostrar los niveles de carga, lo cual facilita su manipulación. La cámara también incluye el software SmartView®, que permite visualizar, optimizar y analizar las imágenes termográficas [38].

4.2.2 Termohigrómetro:

Un termohigrómetro es un instrumento para medir la temperatura y la humedad relativa. Este equipo se usará para determinar las variaciones de temperatura y humedad que se presenten en el laboratorio durante la adquisición de las imágenes. Conocer dichas variaciones es fundamental para describir qué tan drásticas fueron y de igual manera, permitirá el análisis de cómo influyen estos parámetros en los cálculos que se van a desarrollar.

4.2.3 Lámparas halógenas

La lámpara halógena modelo 64 COMBO es un dispositivo reflector con filamento de tungsteno, es utilizada como fuente de excitación, cuenta con una alimentación de 120 V a 60 Hz y una potencia de 500 W. Esta lámpara no cuenta con un sistema de control on/off, por lo que requiere un funcionamiento manual, esto significa que debe ser desconectada y conectada para encenderla y apagarla.

4.2.4 Base de datos

Se diseñó un protocolo de manejo y adquisición de muestras (Anexo 1). En dicho protocolo se describen los conceptos más relevantes para el desarrollo de la adquisición de imágenes. Se hizo uso de una muestra de 120 aguacates, los cuales fueron adquiridos de un CA de la región. La toma de las imágenes se ejecutó en dos etapas, variando las condiciones de excitación externa: La primera donde las lámparas halógenas están encendidas donde se tomaron las imágenes en un tiempo determinado de 36 segundos en el cual se obtuvieron 12 imágenes, el tiempo de captura definida es de 3 segundos; esta condición de tiempo de captura es válida para ambas etapas. En

segunda instancia, se procede a apagar la fuente de excitación, y en el transcurso del proceso de enfriamiento, se realiza la captura de 18 imágenes en un tiempo establecido de 54 segundos. Se obtienen un total de 30 imágenes para el análisis correspondiente.

Es importante aclarar que una característica relevante es el formato de almacenamiento de las imágenes. Estas deben estar en formato *.is2* pues es el formato que permite en el Smartview exportar los datos de temperatura. De igual manera se sugiere almacenar las imágenes en una memoria externa y no directamente en la memoria de la cámara, porque exportar las imágenes a otro dispositivo es un proceso bastante tedioso debido a la cantidad de imágenes, igualmente en el protocolo de adquisición se encuentran las recomendaciones a tener en cuenta (Anexo 1). En la investigación actual se presentó un inconveniente relacionado con lo mencionado, ya que se tenían más de 3000 archivos en la memoria de la cámara y exportar las imágenes tardó más de 8 días, el proceso se hizo un poco extenuante y se presentaron errores, como efecto de esto se perdió la información de 2 frutos, lo que modificó el tamaño de la muestra, reduciéndose a 118 aguacates.

4.3 Preprocesamiento y procesamiento de las imágenes

4.3.1 Preprocesamiento de las imágenes termográficas

El preprocesamiento de las imágenes es un paso preliminar al procesamiento de las imágenes termográficas, el cual facilita el análisis.

La información que permite determinar propiedades físico-químicas de los frutos se obtiene de los cambios en la temperatura, en este caso los gradientes se pueden apreciar en el fruto, por tanto, cualquier área diferente al mismo mantiene temperatura constante y su análisis aumenta el volumen de datos, es necesario eliminar estos segmentos, posteriormente se realizó la binarización de las mismas, obteniendo el umbral correspondiente con base en ensayo y error. Lo anterior tiene como finalidad encontrar la máscara más precisa para cada fruto, y así conservar la información del aguacate, teniendo la máscara se procede a multiplicarla por la imagen original [8]. En la figura 4 se muestra el resultado de la multiplicación.

Figura 9. Multiplicación de la imagen termográfica por la máscara

4.3.2 Procesamiento de las imágenes

Una vez se obtiene la información del fruto es necesario realizar un estudio de las técnicas de extracción de características puesto que estas serán fundamentales en el proceso de clasificación. Teniendo en cuenta diversos estudios relacionados con la TI [39] es evidente el uso de características estadísticas tales como temperatura máxima, mínima, promedio, asimetría, entre otras. Dichas características conforman una base de datos que conlleva a la creación de un modelo de clasificación.

En áreas como la investigación, la estadística se ha constituido como una herramienta fundamental puesto que permite planear, recolectar, organizar, representar, interpretar y analizar la información referente a individuos u observaciones de un fenómeno al cual se le estudia características en común. En consecuencia, el análisis de dichas características ayuda a describir comportamientos de la información, obtener conclusiones y dar recomendaciones para la toma de decisiones. Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a describir el proceso de elección de características estadísticas para la presente investigación.

Como se mencionó en el preprocesamiento de las imágenes, es importante conservar la información del fruto; una vez se obtienen las máscaras, se procede a aplicarlas a los aguacates en cada una de las etapas, como se ve en la figura 4. En consecuencia, se eligieron las características estadísticas más relevantes y que mayor información permite analizar, según la teoría y diferentes estudios realizados con TI. Es preciso aclarar que esta técnica de caracterización es bastante común en estudios de cáncer de mama [39], [40], por lo que se hizo conveniente relacionar dichos estudios con el presente, debido a la forma ovalada de ambos objetos de investigación.

Haciendo uso de las funciones y ayuda de Matlab se calcula un total de 9 características estadísticas para cada una de las imágenes: temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura promedio,

desviación estándar, asimetría, rango, curtosis y entropía con dos variaciones. Dichas características se calculan a partir de los valores de temperatura del fruto y no del fondo de la imagen termográfica, es importante recordar que los valores del fondo no aportan valores al análisis. Con la lámpara encendida se obtuvieron 12 imágenes por cada fruto debido a la condición de adquisición, se tiene como resultado 1416 características. En la etapa de enfriamiento, se obtuvieron 2124 características debido a que se contaba con 18 imágenes por fruto.

4.4 Clasificadores

Para la clasificación de plagas o enfermedades en el aguacate Hass se utilizan herramientas de machine learning, como clasificadores lineales y redes neuronales.

4.4.1 Classification learner

Dentro de las aplicaciones que ofrece Matlab, se encuentra classification learner. Esta aplicación permite explorar el aprendizaje automático supervisado utilizando diferentes clasificadores. Permite explorar los datos, seleccionar variables de entrada, especificar esquemas de validación, entrenar modelos, evaluar resultados e identificar automáticamente los predictores y variables de respuesta según el tipo de datos. Dentro de los clasificadores lineales se tiene: árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial (SVM), vecinos más cercanos (KNN), entre otros. El entrenamiento de estos clasificadores puede darse bajo dos métodos de validación comúnmente utilizados; en primera instancia, se tiene que la validación cruzada es utilizada para evaluar los resultados de un análisis estadístico y así garantizar que son independientes de la partición entre datos de entrenamiento y prueba, es decir, cuando el conjunto de datos se divide aleatoriamente en 'k' grupos, y uno de los grupos se utiliza como conjunto de prueba y el resto se utiliza como conjunto de entrenamiento. Esto permite entrenar en múltiples divisiones de prueba.

Por otro lado, holdout validation, suele recomendarse cuando se tiene un conjunto de datos muy grandes. Este método se divide por el conjunto de datos de entrenamiento, y el conjunto de datos de validación. Comúnmente se utiliza el 70% para entrenamiento y el 30% para la validación, aunque estos valores son ajustables según la necesidad del proceso.

4.4.2 Redes neuronales: Generate pattern recognition network

Las redes neuronales artificiales son una técnica que se inspira en el funcionamiento de las neuronas del cerebro humano. Se basan en una idea sencilla: dados unos parámetros hay una forma de combinarlos para predecir cierto resultado [41].

Cada una de las neuronas de una capa oculta sopesa sus entradas de forma diferente, y de esta manera aprende características diferentes de los datos. En consecuencia, la neurona de salida puede obtener las características intermediarias, no sólo las entradas originales. Al incluir más de una capa oculta, se permite que la red neuronal pueda aprender sobre varios niveles de abstracción de los datos [42].

Dentro de las aplicaciones de Matlab se encuentran neural net clustering, neural net fitting, neural net pattern recognition, entre otros, cada uno de estos tiene diferentes enfoques, en el presente trabajo se profundiza en pattern recognition, puesto que tiene como finalidad encontrar patrones que facilite la posterior clasificación.

5. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Los resultados que se presentan a continuación tienen que ver con la eficiencia de diferentes métodos de clasificación usados para detectar plagas o enfermedades en el aguacate Hass. Es preciso recordar que los cultivos de aguacate se ven afectados por diversos agentes patógenos que solo son detectados de manera empírica o cuando son visibles por el daño en el fruto, esto ha perjudicado la calidad del fruto, generado efectos negativos en la producción.

Haciendo uso de la aplicación *classification learner*, se realizaron una serie de entrenamientos en los cuales se modificaron los parámetros de predicción y respuesta, es decir, se realizó una variación en el número de variables de entrada. Se hizo uso del método de validación *holdout validation*, el cual se probó con un porcentaje de entrenamiento de 70% y 30% de validación. El método se validó con todos los clasificadores que se encuentran en dicha aplicación, los cuales han sido previamente mencionados. A pesar de modificar las variables de entrada, los porcentajes de validación y entrenamiento, no se obtuvo un resultado óptimo, esto se puede observar en el Anexo 4.

De igual manera, se procede a validar las redes neuronales como método de clasificación óptimo. Para esto, se diseñó una red neuronal que almacena el modelo más eficiente para la clasificación. Durante el diseño se tuvo en cuenta diferentes parámetros, entre ellos las entradas de la red que corresponde a las 9 características previamente calculadas para las muestras, las salidas que representan las 5 clases de plagas o enfermedades definidas en el etiquetado (ver tabla 1) y el número de capas ocultas las cuales pueden interpretarse como “características” a nivel superior o atributos de los datos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente definido, después de una serie de entrenamientos que conllevó a procesar cada red neuronal más de 72 horas, se almacenaron las redes que presentaron el máximo porcentaje de exactitud. Para obtener este valor máximo, se implementó un criterio de parada que permite que el programa no se detenga hasta obtener un valor mínimo de exactitud de 70%; esta implementación resultó óptima, pues cada red sobrepasa el mínimo porcentaje estimado. Finalmente se obtienen dos modelos de redes neuronales para cada etapa de adquisición,

simultáneamente se obtiene una tercera red que se modeló para una fase integradora de las dos etapas de adquisición y así obtener un entrenamiento para la totalidad de los datos.

En la siguiente tabla se consignan los mejores valores obtenidos en el diseño final de las redes neuronales para cada etapa:

ETAPAS	# CAPAS OCULTAS	% EXACTITUD
Lámpara encendida	100	77.3
Lámpara apagada	100	82.1
Etapas integradas	100	79.1

Tabla 4. Valores de exactitud obtenidos en cada etapa.

A continuación, se muestran el esquema de cada de las redes neuronales que presentaron mejor resultado en cada etapa y así mismo la matriz de confusión tanto del entrenamiento, como la validación y prueba, también se muestra la matriz de confusión con el porcentaje de exactitud total de la red.

Figura 10. Resultado obtenido para la red neuronal de la primera etapa

Figura 11. Resultado obtenido para la red neuronal de la segunda etapa

Figura 12. Resultado obtenido para la red neuronal de las etapas integradas

En los anexos 5, 6, 7 se encuentran consignadas las redes neuronales para cada etapa respectivamente.

Como resultado se obtiene una interfaz gráfica amigable con el usuario que cuenta con las herramientas necesarias para la identificación de determinadas plaga o enfermedades en el aguacate Hass, la interfaz cuenta con un botón que permite cargar y visualizar la imagen termográfica, de igual forma se podrá definir el umbral que mejor se ajuste para la segmentación de la información, finalmente el usuario podrá elegir la etapa en la cual realizará la clasificación, teniendo en cuenta que cada etapa representa una modelo diferente. En el recuadro inferior izquierdo se visualiza la plaga o enfermedad que se le atribuye al fruto que el usuario desee analizar, en el Anexo 8 se puede observar el archivo que contiene la interfaz gráfica de usuario.

Figura 13. Apariencia interfaz gráfica de usuario.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

- El proceso de adquisición de imágenes es un paso fundamental para consolidar las bases de la investigación, específicamente en el procesamiento de imágenes termográficas. En este sentido, se diseñó un protocolo de adquisición de imágenes termográficas que contiene una serie de conceptos básicos sobre TI y el proceso a seguir para la recolección de datos. Este se caracteriza por incluir recomendaciones útiles para el proceso y para futuras investigaciones, a su vez, el protocolo es reproducible y será de gran utilidad para el grupo de investigación de electrofisiología de la Universidad Tecnológica de Pereira.
- La preparación de las imágenes es fundamental para verificar que la información que se va a tratar es la más relevante, es por esto que se implementó una serie de algoritmos que permiten filtrar la información que no es necesaria. La implementación de dichos algoritmos tuvo como finalidad crear las máscaras de cada fruto facilitando el acondicionamiento de la imagen, puesto que permitió obtener valores precisos y necesarios como condición esencial para la exactitud de la clasificación.
- La estadística se ha constituido como un pilar fundamental a la hora de analizar un conjunto de datos. La metodología que se desarrolló se apoya en estos principios, además de hacer uso de herramientas que hacen parte del procesamiento de imágenes, que permite hacer más evidentes en las imágenes ciertos detalles que se desean analizar. Para la extracción de características fue fundamental tomar los valores de temperatura que están relacionados exclusivamente con el fruto; el valor de cada característica se obtuvo de las diferentes funciones de Matlab. La caracterización fue un proceso fundamental para la clasificación.
- Para el proceso de clasificación se utilizó redes neuronales artificiales, siendo esta una técnica que en los últimos años ha tomado protagonismo en el proceso de aprendizaje supervisado. Se obtuvo el diseño de las redes neuronales para cada una de las etapas después de una serie de entrenamientos donde se modificaron los diferentes parámetros de

la red neuronal hasta obtener el mayor porcentaje de exactitud, y así garantizar que la clasificación de plagas o enfermedades fuera satisfactoria.

- La detección de plagas o enfermedades en el aguacate Hass por medio de la TI activa es una técnica viable y que muestra gran potencial de reproducibilidad debido a que se obtuvieron resultados prometedores de exactitud entre el 70% y 85% considerando que se realizó una prueba piloto. Estos porcentajes pueden ser aceptados teniendo en cuenta que, en la literatura, los estudios en el aguacate son muy reducidos y más aún por la inexistencia de estudios sobre la detección de agentes patógenos por TI; lo que convierte la técnica en innovadora, además de no ser invasiva ni destructiva. Aunque se conocen otras técnicas tales como rayos X, imágenes hiperespectrales, espectroscopia óptica que han sido usadas para el estudio en otros frutos, estas presentan costos computacionales elevados o daños en los frutos, entre otras desventajas, mientras que la TI representa una implementación sencilla en donde no requiere calibración previa, el volumen de datos no es exageradamente elevado y las condiciones ambientales no representan un limitante. Estas características pueden facilitar el desarrollo general de esta técnica en el futuro.

6.2 Recomendaciones

La metodología desarrollada en este trabajo muestra ser prometedora, la termografía infrarroja tiene potencial para la detección de plagas o enfermedades en el aguacate Hass. Sin embargo, se pueden hacer recomendaciones una serie de recomendaciones para futuros trabajos.

- Es preciso recordar que el proceso de la creación de las máscara es importante para conservar la información necesaria, se recomienda que a la hora de tomar las imágenes termográficas se garantice una buena calidad y enfoque del fruto para así poder distinguir el borde del aguacate y discriminar el fondo. Esto evitará que a la hora del preprocesamiento no se confunda información, y a su vez permitirá la creación de una máscara más precisa que traerá mejores resultados.

- Se recomienda hacer uso de la base de datos de las máscaras, puesto que estas han sido probadas con detenimiento. El usuario puede crear la máscara manualmente en la interfaz gráfica y obtendrá buenos resultados, pero es más conveniente hacer uso de las máscaras previamente realizadas ya que el resultado será más preciso.
- Las lámparas halógenas son un elemento fundamental como fuente de excitación de los frutos, sin embargo, estas no cuentan con un control on/off de su funcionamiento. Esto hace que el sistema sea impreciso y puede generar algún impacto negativo como cambiar la posición de la lámpara si no se es lo suficientemente cuidadoso. Se recomienda adaptar las lámparas a un sistema en el que se tenga un mejor control de encendido y apagado de las mismas.

7. REFERENCIAS

- [1] U.E SantaCruz and G.J.M Rivera, "DISTINCIÓN DE SÍNTOMAS DEL VIROIDE Sun blotch EN EL AGUACATERO (Persea americana Mill.) EN MÉXICO", *Centro de Investigaciones Agrícolas de Michoacán (CIAMICH, A.C.)*, 2020.
- [2] A. Pou, M. Diago, H. Medrano, J. Baluja and J. Tardaguila, "Validation of thermal indices for water status identification ingrapevine", *El Sevier*, 2020.
- [3] E. Veraverbeke, P. Verboven, J. Lammertyn, P. Cronje, D. Baerdemaeker and B. Nicolai, "Thermographic surface quality evaluation of apple", *The society for engineering in agricultural, food, and biological systems*, 2003.
- [4] S. Offermann et al., *Infrared transient thermography for non-contact, Non-destructive inspection of whole and dissected apples and of cherry tomatoes at diferent maturity stages.*, 26th ed. Instrumentation Science & Technology, 1998.
- [5] Kuzy, Y. Jiang and C. Li, "Kuzy J., Jiang Y., Li C. Blueberry bruise detection by pulsed thermographic imaging", *ElSevier*. 2018, febrero.
- [6] Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, "Cadena productiva Aguacate", 2020.
- [7] Sepulveda, "Cultivos de café en Quindío pasaron de 78.000 a 23.000 hectáreas," *El tiempo*, 2018.
- [8] Colprensa, "Colombia exportará primeras toneladas de aguacate Hass hacia Argentina," *El país*, 2019.
- [9] Diseño de un prototipo portable para la determinación de la calidad del aguacate Hass, usando termografía infrarroja. Jennifer Bustamante Mejia, 2019, pp. 5,6,7,8.
- [10] A. Arachchige Surantha, A. Robson, D. Lamb and E. Dann, "Assessment of canopy porosity in avocado trees as a surrogate for restricted transpiration emanating from phytophthora root rot", *Remote sensing*, 2019.
- [11] A. Arachchige Surantha, J. James Robson, D. Lamb, E. Dann and C. Searl, "Quantifying the severity of phytophthora root rot disease in avocado trees using image analysis", *Remoting sensing*, 2020.

- [12] E. Granum et al., "Metabolic responses of avocado plants to stress induced by Rosellinia necatrix analysed by fluorescence and thermal imaging", *Eur J Plant Pathol*, 2020. Available: 10.1007/s10658-015-0640-9.
- [13] Abdulridha, R. Ehsani and A. de Castro, "Detection and differentiation between laurel wilt disease, phytophthora disease, and salinity damage using a hyperspectral sensing technique", *MDPI*, 2016.
- [14] S. Sankaran, R. Ehsani, S. Inch and R. Ploetz, "Evaluation of Visible-Near Infrared Reflectance Spectra of Avocado Leaves as a Non-destructive Sensing Tool for Detection of Laurel Wilt", *Plant Disease*, vol. 96, no. 11, pp. 1683-1689, 2012. Available: 10.1094/pdis-01-12-0030-re.
- [15] A. De Castro a, R. Ehsani a, R. Ploetz b, J. Crane b and J. Abdulridha a, "Optimum spectral and geometric parameters for early detection of laurel wilt disease in avocado", *ELSEVIER*, 2015.
- [16] J. Hariharan, J. Fuller, J. Abdulridha, A. Lerwill and Y. Ampatzidis, "Finite difference analysis and bivariate correlation of hyperspectral data for detecting Laurel Wilt Disease and Nutritional Deficiency in Avocado", *Remote sensing*, 2019.
- [17] J. Abdulridha, R. Ehsani, A. Abd-Elrahman and Y. Ampatzidis, "A remote sensing technique for detecting laurel wilt disease in avocado in presence of other biotic and abiotic stresses", *El Sevier*, 2018.
- [18] H. Beltrán, J. Soria, D. Téliz , D. Ochoa , C. Nava and S. Ochoa. "Detección satelital y molecular del viroide de la mancha de sol del aguacate (Avocado Sunblotch Viroid, ASBVd)", *ELSEVIER*, 2014.
- [19] J. Kuzy, Y. Jiang and C. Li, "Blueberry bruise detection by pulsed thermographic imaging", *ELSEVIER*, 2020.
- [20] Y. Sekozawa, S. Sugaya and H. Gemma, "Observations of Ice Nucleation and Propagation in Flowers of Japanese Pear (*Pyrus pyrifolia* Nakai) using Infrared Video Thermography", 2004.
- [21] C. Uma Maheswari, K. Obi Reddy, A. Varada Rajulu and B. Guduri, "Tensile Properties and Thermal Degradation Parameters of Tamarind Fruit Fibers", *Journal of Reinforced Plastics and Composites*, vol. 27, no. 16-17, pp. 1827-1832, 2008. Available: 10.1177/0731684407087559 [Accessed 10 December 2020].
- [22] S. Sankaran, R. Ehsani, S. Inch and R. Ploetz, "Evaluation of Visible-Near Infrared Reflectance Spectra of Avocado Leaves as a Non-destructive Sensing Tool for Detection of Laurel Wilt", *Plant Disease*, vol. 96, no. 11, pp. 1683-1689, 2012. Available: 10.1094/pdis-01-12-0030-re [Accessed 10 December 2020].

- [23]"¿Qué es la termografía infrarroja?", *FLUKE*, 2020. [Online]. Available: <https://www.fluke.com/es-co/informacion/mejores-practicas/aspectos-basicos-de-las-mediciones/termografia/que-es-la-termografia-infrarroja>.
- [24] "Termografía Infrarroja | Cámaras termográficas y termómetros infrarrojos", *VISION TIR*, 2020. [Online]. Available: <https://visiontir.com/es/termografia-infrarroja-camaras-termografias-y-termometros-infrarrojos/>.
- [25] "Termografía activa | aplicaciones de la termografía", *Camarastermograficas.es*, 2020. [Online]. Available: https://www.camarastermograficas.es/termografia_activa.html.
- [26]"Significado de Onda electromagnética", *Significados*, 2020. [Online]. Available: <https://www.significados.com/onda-electromagnetica/>.
- [27] "Ondas electromagnéticas - EcuRed", *Ecured.cu*, 2020. [Online]. Available: https://www.ecured.cu/Ondas_electromagn%C3%A9ticas.
- [28] "Electromagnetic Spectra", *Science Direct*, 2019. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/electromagnetic-spectra>.
- [29] A. Gowen, *Applications of thermal imaging in food quality and safety assessment*, 21st ed. Trends in food science & technology, 2020, pp. 190-200.
- [30] "Reflexión y Refracción de Ondas", *Fisicalab*, 2020. [Online]. Available: <http://rsefalicante.umh.es/TemasOndas/Ondas09.htm>.
- [31] "Variedades de aguacate", *Agromatica*, 2020. [Online]. Available: <https://www.agromatica.es/variedades-de-aguacate/>.
- [32] "Aguacate Hass", *ibereco*, 2020. [Online]. Available: <http://www.ibereco.com/articulo/221/aguacate-hass>.
- [33] J. Perez and A. Gardey, "Definición de plaga — Definicion.de", *Definición.de*, 2013. [Online]. Available: <https://definicion.de/plaga/>. <https://definicion.de/plaga/>
- [34] I. Yara, "Principales Plagas y enfermedades del Aguacate | Yara España", *Yara España*. [Online]. Available: <https://www.yara.es/nutricion-vegetal/aguacate/plagas-enfermedades/>.
- [35]"Enfermedades en las plantas | Qué son, tipos que existen y cómo combatirlas | Jardinedia", *Jardinedia*, 2018. [Online]. Available: <https://www.jardinedia.com/enfermedades-las-plantas-tipos-existen-combatirlas/>
- [36]c. Ing. Guy Sela and c. Ing. Guy Sela, "Enfermedades de plantas | Croipaia", *Croipaia*. [Online]. Available: <https://croipaia.com/es/blog/enfermedades-de-plantas/>.

[37] V. Díaz, A. Caicedo Vallejo and A. Carabalí, "Ciclo de vida y descripción morfológica de *Heilipus lauri* Boheman (Coleoptera: Curculionidae) en Colombia", *Acta zoológica mexicana*, 33(2), 231-242. Available: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0065-17372017000200231&lng=es&tlng=es.

[38] "Ti200, Ti300, Ti400 Thermal Imagers - Manual de uso", 2013. [Online]. Available: <https://docs.rs-online.com/7633/0900766b8125b265.pdf> .

[39] U. R. Gogoi, G. Majumdar, M. K. Bhowmik, A. K. Ghosh and D. Bhattacharjee, "Breast abnormality detection through statistical feature analysis using infrared thermograms," *2015 International Symposium on Advanced Computing and Communication (ISACC)*, Silchar, India, 2015, pp. 258-265, doi: 10.1109/ISACC.2015.7377351.

[40] Gonzalez-Hernandez, J., Recinella, A., Kandlikar, S., Dabydeen, D., Medeiros c, L. and Phatak, P., 2018. Technology, application and potential of dynamic breast thermography for the detection of breast cancer. *ELSEVIER*,.

[41] LUCA. 2021. *¿Qué son las Redes Neuronales Artificiales y el Deep Learning o Aprendizaje Profundo?*. [online] Available at: <<https://luca-d3.com/es/data-speaks/diccionario-tecnologico/aprendizaje-profundo>>

[42] 2021. *Redes neuronales*. [online] Available at: <https://ml4a.github.io/ml4a/es/neural_networks/>